


## OLTRE IL COMPASSO


La geometria delle curve



## Una proprietà dell'ellisse

Ci proponiamo di dimostrare che il luogo di punti che “vedono” un'ellisse sotto un angolo retto è una circonferenza.

Possiamo dare due dimostrazioni di questo fatto, una sintetica<sup>1</sup> ed una analitica.



Cominciamo con la prima:

Consideriamo una ellisse di semiassi  $a$  e  $b$ , fuochi  $E$  e  $F$ , centro  $O$  e una tangente  $t$  in un suo punto qualunque  $A$ . Siano  $E_1$  ed  $F_1$  i simmetrici di  $E$  ed  $F$  rispetto a  $t$  e indichiamo con  $\gamma$  la circonferenza di diametro  $E_1 F_1$  e con  $P$  e  $Q$  le intersezioni tra  $\gamma$  e  $t$ . Vogliamo dimostrare che:

(1) la retta  $s$ , perpendicolare a  $t$  in  $P$  è tangente all'ellisse

$$(2) OP = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Dimostriamo (1).

Sia  $F_2$  il simmetrico di  $F$  rispetto a  $s$ .

Si ha allora:

$$PF_2 = PF = PF_1$$

e quindi i punti  $F_1, P, F_2$  sono allineati.

Poiché  $F_1 \hat{P} E = \pi / 2$  (il triangolo  $F_1 P E$  è inscritto in una semicirconferenza) nel triangolo  $F_1 E F_2$  la mediana  $EP$  è anche altezza, quindi tale triangolo è isoscele e  $EF_2 = EF_1 = EA + AF = 2a$ .

Allora se  $B$  è l'intersezione tra  $s$  e  $EF_2$  si ha che


$$EB + BF = EB + BF_2 = EF_2 = 2a.$$

quindi  $B$  è un punto d'intersezione tra  $s$  e l'ellisse.

D'altra parte per ogni punto  $C$ , diverso da  $B$ , della retta  $s$  si ha

$$EC + CF = EC + CF_2 > EF_2 = 2a$$

Così abbiamo dimostrato che  $s$  è tangente in  $B$  all'ellisse.



<sup>1</sup> Per questa dimostrazione siamo debitori al prof. Piergiorgio Giudici del Liceo scientifico “A Volta” di Milano.

Vediamo adesso di dimostrare (2).

Per simmetria rispetto a  $t$  vale la relazione:

$$E_1\hat{P}F = E\hat{P}F_1 = \pi/2$$

Quindi:

$$EP^2 + PF^2 = E_1P^2 + PF^2 = E_1F^2 = 4a^2$$


Indicando con  $H$  il piede dell'altezza da  $P$  a  $EF$  si ha:

$$EP^2 + PF^2 = PH^2 + (EO + OH)^2 + PH^2 + (OF - OH)^2$$

$$EO = OF = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$EP^2 + PF^2 = 2PH^2 + 2OH^2 + 2(a^2 - b^2) = 2OP^2 + 2(a^2 - b^2)$$

$$OP^2 = 2a^2 - (a^2 - b^2) = a^2 + b^2.$$



Per dare la dimostrazione analitica indichiamo con  $(x_0, y_0)$  un punto del luogo fissato e siano  $x = acost, y = b\text{sent}, 0 \leq t \leq 2\pi$  le equazioni parametriche dell'ellisse.

Una generica retta per  $(x_0, y_0)$  ha equazione  $y - y_0 = m(x - x_0)$ , cercando le intersezioni con l'ellisse si ottiene  $b\text{sent} - y_0 = m(acost - x_0)$  e se si indica con  $r$  la tangente trigonometrica dell'angolo  $t/2$  si ottiene l'equazione

$$b \frac{2r}{1+r^2} = ma \frac{1-r^2}{1+r^2} + y_0 - mx_0,$$

cioè

$$(y_0 - mx_0 - ma)r^2 - 2br + (y_0 - mx_0 - ma) = 0.$$

Imponendo la condizione di tangenza, si ottiene:

$$\frac{\Delta}{4} = b^2 - (y_0 - mx_0)^2 + m^2 a^2 = 0$$

equazione di secondo grado in  $m$  che deve avere radici con prodotto uguale a  $-1$  (affinché le due tangenti siano perpendicolari). Riscritta l'equazione nel modo seguente

$$m^2(a^2 - x_0^2) + 2mx_0y_0 + b^2 - y_0^2 = 0,$$

si vede subito che il prodotto delle radici è

$$\frac{b^2 - y_0^2}{a^2 - x_0^2},$$

e dunque deve essere  $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$ , cioè  $(x_0, y_0)$  sta sulla circonferenza che ha centro nel centro dell'ellisse e raggio  $\sqrt{a^2 + b^2}$ .

Viceversa è facile vedere, effettuando in senso inverso gli stessi passaggi, che ogni punto di tale cerchio ha le tangenti all'ellisse tra loro perpendicolari.